


JAKIE SĄ MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE NOWEGO LEKU?

Działania niepożądane mogą, ale nie muszą wystąpić. Możliwe skutki uboczne to **zakażenia górnych dróg oddechowych**, **zaburzenia czucia**, większe ryzyko **złamania kości** oraz **zwiększenie masy ciała** (na skutek obrzęków).

U niektórych pacjentów mogą pojawić się problemy z **wątrobą i wzrokiem**. Dlatego lekarz może zlecić Ci badanie stężenia enzymów wątrobowych oraz kontrole u okulisty.



JAK ZMNIEJSZYĆ RYZYKO POWIKŁAŃ CUKRZYCY?



GDZIE UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI O NOWYM LEKU?

Dla bezpieczeństwa stosuj swój nowy lek zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Uwagi i zalecenia farmaceuty



NOWY LEK
OPIEKA
FARMACEUTYCZNA

MATERIAŁ EDUKACYJNY DLA PACJENTÓW

Nowy lek w leczeniu cukrzycy typu 2

PIOGLITAZON

Nazwa leku	
Dawka leku	
Dawkowanie/ pora dnia	

CUKRZYCA TYPU 2 - JAK FARMACEUTA MOŻE CI POMÓC?

Porozmawiaj z farmaceutą na temat cukrzycy. Farmaceuta:

- wyjaśni Ci, jak działają leki na tę chorobę i jak je prawidłowo stosować
- pokaże Ci, jak za pomocą glukometru samodzielnie zmierzyć poziom glukozy we krwi
- opowie o zmianach w stylu życia, dzięki którym łatwiej będziesz kontrolować cukrzycę

Więcej o zdrowym stylu życia znajdziesz w ulotce o cukrzycy. Poproś o nią farmaceutę.



Tę informację opracowano na podstawie Charakterystyk Produktów Lekniczych zawierających pioglitazon, a także:

- <https://ptdiab.pl/zalecenia-ptd/zalecenia-aktywni-czlonkowie-2024>
- Czupryniak L., Placzekiewicz-Jankowska E., Strojek K.: Leczenie cukrzycy typu 2 -farmakoterapeutyczna rewolucja dokonana. Omówienie stanowiska American Diabetes Association i European Association for the Study of Diabetes 2022. Med. Prakt., 2022; 12: 32-48

W JAKI SPOSÓB PIOGLITAZON MOŻE CI POMÓC W CUKRZYCY?

Pioglitazon pomaga lepiej wykorzystać insulinę - hormon trzustki kontrolujący stężenie glukozy we krwi. Więcej glukozy trafia do komórek, dzięki czemu jej stężenie we krwi spada. Zapobiega to powikłaniom cukrzycy, takim jak uszkodzenie nerek, naczyń krwionośnych czy układu nerwowego.

CO ZROBIĆ, GDY PRZYJMujesz TEŻ INNE LEKI?

Pioglitazon może wpływać na inne leki, a one również mogą wpływać na działanie Twojego nowego leku. Dlatego koniecznie powiedz lekarzowi lub farmaceucie o:

- wszystkich lekach, które obecnie zażywasz
 - lekach, które planujesz przyjmować
- Pamiętaj, żeby powiedzieć też o lekach wydawanych bez recepty, ziołach i suplementach diety.

Podczas stosowania z insuliną lub niektórymi innymi lekami na cukrzycę może dochodzić do **hipoglikemii**, czyli zbyt niskiego poziomu cukru we krwi. Lekarz może poprosić Cię o regularne mierzenie poziomu glukozy we krwi, aby dostosować dawki leków.

Więcej informacji o sposobach radzenia sobie z hipoglikemią znajdziesz w ulotce, którą wręczy Ci farmaceuta.

CZY PIOGLITAZON MOŻNA STOSOWAĆ W CIĄŻY I PODCZAS KARMIENTA PIERSIĄ?

Jeżeli jesteś w ciąży lub karmisz piersią, nie powinnaś stosować pioglitazonu. Jeśli podejrzewasz u siebie ciążę, wykonaj test ciążowy. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku, niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem.

Uwaga! Pioglitazon może wznowić owulację (jajeczkowanie) i zwiększać możliwość zajścia w ciążę (np. u pacjentek z zespołem policystycznych jajników).

KIEDY PILNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM?

Poszukaj pomocy medycznej, jeśli zauważysz u siebie objawy:

- **ciężkiej reakcji alergicznej** (np. obrzęk twarzy, języka lub gardła, trudności z połykaniem i oddychaniem, świszczący oddech, przyspieszone bicie serca, błąd i chłodna skóra, zawroty głowy lub uczucie osłabienia)
- **niewydolności serca** (np. duszność, miejscowy obrzęk, gwałtowny wzrost masy ciała)
- **zapalenia wątroby** (np. żółtaczką, ciemne zabarwienie moczu)
- **problemów z drogami moczowymi** (np. krwimocz, bolesne oddawanie moczu, trudności w oddawaniu moczu, uczucie parcia na mocz lub nietrzymanie moczu)

JAK STOSOWAĆ PIOGLITAZON?

Ten lek jest przeznaczony do długotrwałej terapii i może być połączony z innym lekiem obniżającym poziom glukozy we krwi.

W trakcie leczenia przestrzegaj następujących zasad:

1. Lek stosuj codziennie o stałej porze, zgodnie z zaleceniem lekarza.
2. Tabletkę z piglitazonem można przyjmować podczas posiłku lub między posiłkami.
3. Lek popijaj tylko wodą.
4. Tabletki nie należy dzielić, rozkruszać ani rozgryzać, chyba, że jest to wyraźnie dozwolone w ulotce.
5. Jeśli zapomnisz o dawce leku, następną przyjmij o zwykłej porze. Nie stosuj podwójnej dawki, aby uzupełnić zapomnianą tabletkę.
6. Jeśli masz prawidłowy poziom cukru we krwi, to oznacza, że lek działa dobrze. Dlatego nie odstawiaj go, ani samodzielnie nie zmieniaj dawki.
7. Nie dziel się lekiem z innymi – może im poważnie zaszkodzić. Nie przekazuj go nawet osobie, która ma podobne objawy choroby.

